

## RATKILL BLOX


BIOCIDA

Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Difenacoum, con Denatonio Benzoato.

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Difenacoum puro	g	0,005
Denatonio benzoato puro	g	0,001
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a	g	100



### IL PRINCIPIO ATTIVO

Il Difenacoum appartiene alla seconda generazione di anticoagulanti rodenticidi. È dotato di eccezionale efficacia sia come ratticida sia come topicida anche contro i roditori ormai resistenti agli anticoagulanti della 1° generazione.

Se ingerito in quantità sufficiente è letale anche una sola ingestione. Il principio attivo è ad azione anticoagulante e pertanto i roditori che ingeriscono le esche muoiono nel giro di qualche giorno per emorragie interne senza destare sospetto negli altri componenti la colonia.

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, RATKILL BLOX contiene Denatonio Benzoato, che è considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, quindi, se ne cibano avidamente.

### LE CARATTERISTICHE

La ricerca di nuovi rodenticidi capaci non solo di combattere la resistenza sviluppatasi verso gli anticoagulanti tradizionali nel *Rattus rattus*, nel *Rattus norvegicus* e nel *Mus musculus* ma anche di migliorare il controllo nei roditori non-resistenti, ha portato allo sviluppo di una nuova generazione di anticoagulanti dotati di eccezionali qualità sia come ratticidi sia come topicidi. RATKILL BLOX è un'esca rodenticida che appartiene a questa categoria di anticoagulanti.

### L'APPLICAZIONE

RATKILL BLOX è un'esca rodenticida pronta all'uso efficace contro topolino domestico (*Mus musculus*), ratto bruno (*Rattus norvegicus*), ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione.

RATKILL BLOX per uso professionale può essere usato all'interno e intorno gli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

Utilizzare le esche finite e pronte all'uso all'interno degli appositi contenitori per esche già in commercio ("mangiatoie", "erogatori", "stazioni" ecc.) per evitare dispersione di esca nell'ambiente e l'accesso ai bambini, animali domestici e animali non bersaglio.

Osservare l'area di infestazione, porre i contenitori che contengono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza fra loro.

Le dosi consigliate sono:

- Topolino domestico: 2 esche (40 g) x 10 m
- Ratto grigio e ratto nero: 3-5 esche (60-100 g) x 10 m

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure di primo soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere il prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste.

### LA FORMULAZIONE

RATKILL BLOX è un topicida in blocco paraffinato da 20 g contenuto nella confezione Pratika, facile da trasportare e richiudibile.

### LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Prodotto Biocida (PT 14). Uso professionale.

Autorizzazione del Ministero della Salute N. IT/2014/00260/AUT

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - RATKILL BLOX è classificato (H360D) può nuocere al feto e (H373) può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.



PERICOLO

colkim.it