

RODIFEN AVENA

BIOCIDA

Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Difenacoum.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Difenacoum	g	0,005
Denatonio benzoato puro	g	0,001
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a	g	100



IL PRINCIPIO ATTIVO

Il Difenacoum appartiene alla seconda generazione di anticoagulanti rodenticidi. È dotato di eccezionale efficacia sia come ratticida sia come topicida anche contro i roditori ormai resistenti agli anticoagulanti della 1ª generazione.

Se ingerito in quantità sufficiente è letale anche una sola ingestione. Il principio attivo è ad azione anticoagulante e pertanto i roditori che ingeriscono le esche muoiono nel giro di qualche giorno per emorragie interne senza destare sospetto negli altri componenti la colonia.

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, RODIFEN AVENA contiene Denatonio Benzoato, che è considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, quindi, se ne cibano avidamente.

LE CARATTERISTICHE

RODIFEN AVENA è efficace contro diversi tipi di roditori: topolino domestico (*Mus musculus*), ratto bruno (*Rattus norvegicus*), ratto nero (*Rattus rattus*). La morte del roditore avviene 4-10 giorni dopo l'ingestione di una dose letale che può essere assunta in due o più prese.

L'APPLICAZIONE

RODIFEN AVENA può essere usato esclusivamente negli edifici e nelle aree ad essi circostanti e nei tombini.

Posizionare RODIFEN AVENA in tutta la zona infestata e in luoghi non accessibili agli animali non bersaglio. Non posizionare il prodotto indiscriminatamente.

Dosaggio:

Specie	Situazione	Dose di applicazione per ciascun punto esca	Frequenza d'ispezione raccomandata
Topi	Domestico, commerciale, rurale	fino a 30 g ogni 1-2 metri	Frequentemente nei primi 10 giorni e regolarmente fino a quando continua il consumo
Ratti	Domestico, commerciale, rurale	fino a 200 g ogni 10 metri	Frequentemente nei primi 10 giorni e regolarmente fino a quando continua il consumo
	Nei tombini	fino a 200 g ogni punto esca	Frequentemente nei primi 10 giorni

Controllare regolarmente le esche e sostituire quelle mangiate o contaminate. Se un punto esca è completamente consumato, aumentare la quantità di esche. Utilizzare le esche finite e pronte all'uso all'interno degli appositi contenitori per esche già in commercio ("mangiatoie", "erogatori", "stazioni" ecc.) protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

LA FORMULAZIONE

RODIFEN AVENA è una formulazione che ha come base alimentare avena schiacciata di alta qualità. Questa forma fisica è particolarmente appetibile per i roditori e può essere utilizzata in combinazione con adatti erogatori (RISTORAT, linea PROTECTA, ecc).

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Prodotto Biocida (PT 14). Uso professionale. Autorizzazione del Ministero della Salute N. IT/2013/000148MRA

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - RODIFEN AVENA è classificato (H360D) può nuocere al feto e (H373) può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.



PERICOLO

SCT-00509